

A gyógyszerallergia vizsgálatáról

tájékoztató

Bevezetés:

A gyógyszereknek gyakran mellékhatásaik is jelentkeznek. Az egyik legismertebb a gyógyszer okozta allergiás reakció.

Gyakran gondolunk erre, ha a gyógyszer alkalmazása során kiütések vagy más panaszok jelentkeznek. Szakirodalmi adatok szerint az antibiotikum allergiára gyanúsak 80-90% -ról kiderül, hogy valójában nem azok, ha megfelelő vizsgálat is történik. E vizsgálatok gondosan válogatott betegeknél biztonságosan és hatékonyan végezhetőek.

Miért fontos biztosan tudni, hogy a gyógyszer okozott-e allergiát?

Ha a gyógyszer allergiás reakciót okoz, az gyakran ismételt adás esetén hevesebb és súlyosabb panaszokhoz vezet. Nagyon ritkán akár életveszélyes súlyos allergiás sokk (anafilaxia) is felléphet. Az esetek nagy részében azonban inkább ugyanazok a bőrtünetek gyakran ugyanazonokon a helyeken jelentkeznek ismételt adás után. Még gyakrabban ismételt adáskor panaszok már nem jelentkeznek, vagyis nem áll fenn gyógyszerallergia. A gyermekek kb. 10% á-nál gondolnak világszerte valamilyen gyógyszerallergiára. Ezen gyermekek gyakran életük végéig nem kapják a gyanúba kevert gyógyszert többé. Helyette általában drágább, esetleg súlyosabb mellékhatások kockázatával járó kezelésre szorulnak. Mindez növeli a kiadásokat és elősegíti a gyógyszerre nem érzékeny kórokozók elterjedését is.

Hogyan lehet megállapítani, hogy valóban fennáll a gyógyszerallergia?

Kórházunkban a gyermekosztályon biztonságos körülmények között egy fél napos vizsgálattal próbáljuk megállapítani, hogy valóban fennáll-e gyógyszerallergia. A vizsgálat során fél óránként provokáljuk a gyermeket a bőrére ajkára kenve, illetve kis dózisban szájon át adva a gyanúba fogott gyógyszert. Közben figyeljük, hogy fellépnek-e a korábban tapasztalt tünetek. Ha ezek nem jelentkeznek, akkor ezzel kizártuk a feltételezett gyógyszerallergiát. Ez történik a vizsgálatok 90%-ában. A teszt után szülők gondozók otthon figyelik tovább a gyermeket. Panasz vagy tünet esetén telefonon jelentkeznek, szükség esetén vizsgálatra jelentkeznek, tünetről esetleg fényképet készítenek.

Teszt után 1 héttel kontrollvizsgálat keretében az orvossal megbeszéljük, a teszt eredményét, melyet írásban is megkapnak. Kétséges eredmény esetén a teszt megismételendő, ez igen ritka.

Milyen veszélye lehet a gyógyszerallergia kivizsgálásának?

A vizsgálat során felléphet allergiás reakció. Bőrkkiütések, viszketés, szem, arc duzzanat, nehezített légzés esetleg súlyos anafilaxiás sokk. Akiknél nagy esély van súlyos reakcióra, náluk nem végezzük el a vizsgálatot. Az eddigi tapasztalatok szerint enyhe reakció is csak ritkán alakul ki, s az gyorsan

megszűnik a megfelelő kezelésre. A szükséges gyógyszereket a vizsgálat alatt előkészítjük, a vizsgálatot végzők pontos előírás szerint dolgoznak és rendszeresen gyakorolják a súlyos reakciók ellátását is.

Mi okozta a tüneteket, ha kiderül, hogy nem a gyógyszer?

A bőrkiütéseket, bőrvizketést, pirosságot gyakran a betegség maga okozza. Vírusos betegségeknél ez nagyon gyakori. Ha ilyenkor a beteg valamilyen gyógyszert is szedett könnyen gondolhatjuk tévesen, hogy a bőrtüneteket gyógyszerallergia okozta.

Mosonmagyaróvár, 2011.09.27.

készítette: dr. Szíjjártó