



Karolina Kórház – Rendelőintézet
Szülészeti-Nőgyógyászati Összevont Osztály
Osztályvezető Főorvos: Dr. Balogh Elek
9200 Mosonmagyaróvár,
Régi Vámház tér 2-4.
Telefon: 06 96/574 -650 Fax: 06 96/574-793
Email: baloghe@mail.karolinakorhaz.hu

20.BETEGTÁJÉKOZTATÓ

MÓDOSÍTOTT NEUGEBAUER-LEFORT MŰTÉT COLPOCLEISIS MEDIANA

A műtét lényege

„A hüvely elülső és hátsó falának összevarrása a középső szakaszon, azon betegek esetében, akiknél nincsenek meg az egyéb helyzetjavító műtétek feltételei, illetve akiknél már nincs igény a további nemi életre.

A beavatkozás célja

A hüvelycsonk vagy a méh előesésének megszüntetése.

Az ellátás folyamata és várható kimenetele:

Megfelelő érzéstelenítés után az elülső és hátsó hüvelyfalról egy négyzet alakú területen a hámot lepreparáljuk. Ezt követően a négyzet alakú sebzések felső, vízszintes, majd oldalsó, függőleges széleit, legvégül az alsó, hüvelybemenethez közeli széleit összevarrjuk. Ily módon a hüvely befordul és a hüvelybemenet beszűkül. A műtét eredményeképp kétoldalt egy-egy keskeny csatorna alakul ki, amin keresztül ürülhet a méhből illetve méhnyakból eredő váladék, másrészt szövethídként hozzájárul az alátámasztáshoz.

A hólyagba állandó katétert helyezünk, melyet a műtétet követő 1-2. napon távolítunk el. Spontán vizeletürítést követően távozhat el kórházunkból.

Műtét előnye:

Akár helyi érzéstelenítésben, csekély megterheléssel elvégezhető.

Kockázatait, illetve lehetséges szövődményeit:

- Kialakulhat inkontinencia (vizeletcsepegés), húzó jellegű kismencedencei fájdalom.

- A megtartott méh később nem hozzáférhető a vizsgálatok számára, méhnyak- ill. méhtest daganat nem ismerhető fel.
- Hólyag-, húgycső-sérülés, végbélsérülés, környező lágyrészek sérülései, tartós katéter viselés.
- Vérzés, gyulladás, trombózis, embólia. A behelyezett varratok elégtelensége.

Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:

- Beavatkozás elhagyása
- Speciális torna
- Különböző pesszáriumok (kocka vagy Mayer-gyűrű) viselése.
- Általános állapottól függően egyéb prolapsus kezelő műtéti eljárások (prolapsusháló beültetés, hasi ill. hüvelyi méheltávolítás a csonk felfüggesztésével)

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges kockázata:

A panaszok fokozódása, a hüvely vagy a méhszáj kisebesedése, tartós vizelettartási képtelenség, húgyúti fertőzések gyakoribbá válása, a hólyag-, végbélsérv kifejezettebbé válása, végbél kiürítésének zavara.”

A kapott írásbeli és szóbeli tájékoztatást megértettem. További kérdésem nincs. További tájékoztatásról kifejezetten lemondok.

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása

.....

1.tanú

.....

2.tanú