

Újszülött kori GBS szepszis

Tájékoztató szülőknek



Újszülött Osztály
Karolina Kórház
2018.



GBS szepszis

GBS = Group B Streptococcus, magyarul B csoportú Streptococcus baktérium.

A világon szinte mindenhol a szülő nők kb. 30 %-ánál ez a baktérium kimutatható a hüvelyváladékukból. Annak ellenére, hogy ez a kórokozó súlyos fertőzést tud kiváltani szerencsére ez nagyon ritka. Ugyanakkor, ha az újszülött megfertőződik és megbetegszik, akkor órák alatt az első 3 napban heves és akár az életet veszélyeztető sokkos állapot alakulhat ki.

Sajnos nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy kinél fog kialakulni ez a súlyos betegség és kinél nem. Ugyanakkor törekszünk rá, hogy akinél erre nagyobb az esély, ott szoros megfigyeléssel és az anya szülés alatti antibiotikus kezelésével ennek az esélyét minimalizáljuk.

Melyik babáknál nagyobb az esély a GBS okozta megbetegedésre?

Koraszülötteknél, idő előtti (több mint 18 – 24 óra) burokrepedés után születetteknél, lázas anyai megbetegedéskor, ha a korábbi baba GBS fertőzést kapott, ha az anya hüvelyváladéka GBS pozitív volt.

Hogyan előzzük meg a GBS fertőzést?

Az anyák szűrésével a 32. hét körüli hüvelyváladék leoltással. A rizikócsoportba tartozó anyáknál a szülés alatt adott antibiotikummal (Jóval a szülés előtt adott antibiotikus kezelés sajnos hatástalan, ezt ma már nem ajánlják). Az emelkedett fertőzés veszélyes gyermekek 12 – 24 órás szoros megfigyelésével és a gyanús esetekben az újszülött azonnali antibiotikus kezelésével.

Mik a GBS fertőzés jelei egy újszülöttnél?

Mivel a megelőző kezelésekkel sem védhető ki mindig teljesen a GBS fertőzés, és akár 3 – 4 nap után is kezdődhet, ezért rendkívül fontos, hogy a szülők felismerjék a GBS fertőzés jeleit gyermekükönél és ilyen esetben haladéktalanul orvoshoz forduljanak.

A GBS fertőzés tünetei nem specifikusak és leginkább ezek kombinációja az, ami az infekció gyanúját felkelti.

Ilyenek:

- láz vagy alacsony hőmérséklet. Magasabb, mint 37,5 vagy alacsonyabb, mint 36,5;
- etetési nehézség kialakulása;
- szürkés bőrszín;
- gyakoribb bukások, hányás jelentkezése;
- bágyadtság, a viselkedés megváltozása, irritáltság vagy apátia;
- nyögdecslő szaporább légzés.

Mit tegyenek a szülők GBS fertőzés gyanúja esetén?

Azonnal forduljanak orvoshoz. A kezelés megkezdésének késése életveszélyes állapothoz, akár halálhoz vezethet, néha órákon belül. Időben elkezdett antibiotikumos kezeléssel a fertőzött betegek zöme maradandó károsodás nélkül gyógyul.