

ÍZÜLETI PUNKCIÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Kedves Betegünk!

Betegségének, gyógyulása érdekében kötelességünk, hogy állapotáról megfelelően tájékoztassuk, valamint gyógykezeléssel kapcsolatos teendőkről részletesen tájékoztassuk.

Az Ön betegsége:

A beavatkozás szükségesség: Diagnosztikus céllal illetve eddigi gyógykezelések mérsékelt hatása miatt gyógyulásának meggyorsítása.

A javasolt vizsgálat: ízületi punkció

Az ízületi punkció célja, hogy az ízületben a gyulladásos folyamat miatt termelődött nagyobb mennyiségű folyadékot eltávolítsuk. A folyadékgyülem feszülést, fájdalmat, mozgáskorlátozottságot okoz az ízületben, tartós fennállás esetén károsíthatja a porcot is. A tünetek megszüntetése érdekében szükséges a folyadék eltávolítása, ?lecsapolása?. A lebocsátott ízületi folyadék laboratóriumi, mikroszkópos vizsgálatra kerül. Az ízületi folyadék elemzése a diagnózis pontosságában segít. A feszülő folyadék leszívása a fájdalmat csökkenti, amennyiben szükséges a beadott gyulladáscsökkentő mellékvesekéreg-hormon (szteroid) injekció a gyulladást, a fájdalmat mérsékli. Ha baktérium okozta ízületi gyulladás gyanúja merül fel, az ízületi punkció, a baktérium kimutatása és az antibiotikum kezelés **életmentő beavatkozás lehet.**

Az ízületi punkció tervezett időpontja:

A javasolt beavatkozás előnye: a diagnózis tisztázása, további károsodás megelőzése, a gyógyulás meggyorsítása.

A beavatkozás elmaradásának kockázata: a gyulladás elhúzódása, **fertőzés esetén életveszélyes állapot kialakulása.**

Lehetséges alternatív eljárás(ok), módszer(ek): nem ismertek

A beavatkozás menete, várható kimenetele: Steril körülmények között a bőr fertőtlenítése után (jóddal, allergiás túlérzékenység esetén egyéb speciális fertőtlenítővel) tűt szúrunk a bőrön át az ízületbe, majd ugyanezen a tűn keresztül a fájdalmas feszülést okozó folyadékgyülemet lebocsátjuk. Amennyiben szükséges, az ízületet átöblítjük. A betegség természete szerint gyulladáscsökkentő gyógyszert (szteroidot) fecskendezünk az ízületbe. A tű kihúzása után a bőrt ismét fertőtlenítjük, steril, gézzel befedjük és leragasszuk a szűrés nyomát, és az ízületet néhányszor behajlítjuk a gyógyszer egyenletes eloszlása érdekében, majd szükség esetén rugalmas pólyával rögzítjük. A pólyát és a kötést másnap reggel lehet levenni, a szűrés helyét addig víz nem érheti; **Jód, Lidocain túlérzékenyegről** feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát.

A beavatkozás mellékhatásai, esetleges szövődménye(i): A beadott gyulladáscsökkentő mellékvesekéreg-hormon (szteroid) injekció mellékhatásaként néhány órás arckipirulás, átmenetileg vérnyomás emelkedés, vízvisszatartás (puffadás) vagy vércukor emelkedés előfordulhat, ritkán egyéb szervek működését is érintheti. Szövődményként **bevérzés** jelentkezhet, mely igen ritkán fordul elő. Ez a tünet vérzékenység, illetve vérzékenységét okozó gyógyszer (Syncumar, Aspirim) szedése esetén gyakoribb. A beadott kristályos hatóanyag ritkán önmagában is fokozhatja az ízületi gyulladást.

A beavatkozás igen ritka, de veszélyes szövődménye az ízület **elfertőzése**. Ilyenkor az ízület igen fájdalmas, meleg, duzzadt lesz, láz, hidegrázás kísérheti a helyi tüneteket. **Ebben az esetben azonnal jelentkezzen kezelőorvosánál, mert akár életveszélyes állapot is kialakulhat.** A szövődmények következtében enyhébb esetben is a gyógytartam elhúzódhat, ritkán súlyosabb esetben maradandó egészségkárosodás alakulhat ki.

Más kezelési lehetőségek, további ellátás: Kiegészítő gyógyszeres és fizioterápiás kezelések a beavatkozást követően is alkalmazhatók.

Ha az ízületi gyulladást fertőzés okozza, akkor az ízületi punkció és az antibiotikus kezelés más módszerrel nem helyettesíthető.

Javasolt életmód: Az állapotnak megfelelő kezelőorvosi felvilágosításban foglaltak szerint.

Önnek a tervezett beavatkozáshoz írásban adott nyilatkozata szükséges. A vizsgálat, beavatkozás elvégzéséhez szükséges nyilatkozatát a beavatkozás megkezdése előtt bármikor visszavonhatja. Annak érdekében, hogy kezelésének indokoltságát és az elért javulását pontosan meg lehessen állapítani, a kezelést végző és az azt ellenőrző szakembereknek ismerniük kell az ön összes egészségügyi adatát.

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT A BEAVATKOZÁS ELVÉGZÉSÉRE

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A kezelőorvosomtól szóbeli tájékoztatást is kaptam a kezelési lehetőségek előnyeiről és kockázatairól. Lehetőségem volt arra, hogy kérdésemet feltegyem és a kérdéseimre választ megkaptam. Jód Lidocain; illetve az alkalmazni kívánt gyógyszerrel szembeni allergiás érzékenységem nincs.: Mindezek alapján önkéntes, minden befolyástól mentes beleegyző nyilatkozatomat megadom, az ízületi punkció és szükség esetén az ízületbe jutató gyógyszeres kezelésbe beleegyezem. Tudomással bírok arról, hogy a beleegyezésemet a beavatkozás megkezdése előtt bármikor visszavonhatom.

Mosonmagyaróvár, {KEZ_OSZT}

.....
beteg aláírása

.....
kezelőorvos aláírása